

УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой/мочевого пузыря с простатой

за 1,5 – 2 часа до обследования необходимо выпить литр негазированной воды и не мочиться,

адекватным наполнением мочевого пузыря является объем не менее 230-280 мл.

УЗИ абдоминальное (ОБП — органов брюшной полости)

Исследование паренхиматозных органов брюшной полости. Исследуется печень, поджелудочная железа и селезенка, в протокол исследования входит исследование желчного пузыря и желчных протоков. Почки анатомически расположены в забрюшинном пространстве, но обычно их исследуют вместе с вышеназванными органами брюшной полости.

Подготовка к исследованию:

1. За 1-2 дня до исследования:

Ø исключить из рациона питания жирную пищу, продукты, вызывающие повышенное газообразование (молоко, черный хлеб и пр.) или содержащие грубую клетчатку (сырые овощи, фрукты, соки);

Ø Принимать эспумизан по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования

1. УЗИ проводится **строго натощак**, в первой половине дня: пациент не должен пить воду, принимать пищу.

2. При **проведении УЗИ во второй половине дня** прием пищи и жидкости прекращается за 5 – 6 часов до УЗ- исследования - утром в этом случае легкий завтрак без приема продуктов, вызывающих газообразование

3. УЗИ органов брюшной полости **не проводится** непосредственно после проведения гастроскопии и колоноскопии.

УЗИ почек

Исследование правой и левой почки, паранефрального пространства и надпочечников.

1. За 1-2 дня до исследования:

Ø исключить из рациона питания жирную пищу, продукты, вызывающие повышенное газообразование (молоко, черный хлеб и пр.) или содержащие грубую клетчатку (сырые овощи, фрукты, соки);

Ø принимать эспумизан по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования, можно 2 капсулы

утром в день исследования (официальные рекомендации ассоциации 24.11.2004 года)

УЗИ проводится в независимости от приема пищи.

УЗИ органов малого таза у мужчин

Исследование предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря, определяется объем остаточной мочи после опорожнения мочевого пузыря. При необходимости проводится УЗИ почек.

Существует два способа проведения органов малого таза у мужчин:

Ø Трансабдоминальное – через переднюю брюшную стенку

Ø Трансректальное (ТРУЗИ)

1. Для трансабдоминального исследования за 1,5 - 2 часа до обследования необходимо выпить литр негазированной воды и не мочиться, адекватным наполнением мочевого пузыря является объем не менее 280 – 300 мл

2. Для трансректального исследования (ТРУЗИ) – необходимо очистить прямую кишку от каловых масс:

Ø За 8-12 часов до исследования вечером перед

УЗ-исследованием выпивается препарат «Фортранс»- аналогично подготовки к исследованию кишечника

Ø За 3-4 часа до исследования не мочиться, если проводится еще и трансабдоминальное исследование.

Ø необходимо провести гигиенические процедуры промежности

Проведение очистительной клизмы в день исследования не допускается, так как информативность метода резко снижается и исследование не несет диагностической ценности.

После выполнения рентгеновского исследования желудка или кишечника с барием ТРУЗИ

проводится спустя 3 дня.

УЗИ щитовидной железы

Исследуется правая и левая доля щитовидной железы, перешеек, регионарные лимфатические узлы – подготовка к исследованию не требуется, исследование проводится в любое время.

УЗИ молочных желез

Исследуется правая и левая молочная железа, регионарные лимфатические зоны оттока
Исследование проводится в любом возрасте

У пациенток до 40 лет с менструальным циклом исследование проводится на 5 -8 день от начала менструального цикла. При пальпации клиницистом объемного образования в любой день менструального цикла.

У пациенток старше 40 лет с менструальным циклом исследование проводится на 5-8 день от начала менструального цикла. При пальпации клиницистом объемного образования в любой день менструального цикла.

У пациенток старше 40 лет без менструального цикла в любой день.