

Дуплексное сканирование почек

Исследование параметров кровотока в почечной артерии и вене, интрааренальных артериях

1. За 1-3 дня до исследования:

Ø исключить из рациона питания жирную пищу, продукты, вызывающие повышенное газообразование (молоко, черный хлеб и пр.) или содержащие грубую клетчатку (сырые овощи, фрукты, соки);

Ø Во время приема пищи любой фермент

Ø принимать эспумизан по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования, 2 капсулы утром в день исследования (официальные рекомендации ассоциации 24.11.2004 года)

1. УЗИ проводится строго натощак, в первой половине дня: пациент не должен пить воду, принимать пищу.

Дуплексное сканирование периферических артерий и вен

исследование параметров кровотока в сосудах верхних и нижних конечностей — специальной подготовки не требуется, необходимо провести гигиенические процедуры на конечностях. Исследование проводится в любое время. В холодный период года желательно чтобы конечности были теплые.

Экстракраниальное дуплексное сканирование (ЭКД, БХЦ)

Исследование параметров кровотока в сонных артериях, позвоночных артериях — специальной подготовки не требуется. Исследование проводится в любое время

Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости

Исследование параметров кровотока в аорте, нижней полой вене, портальной вене, печеночных венах.

1. За 1-3 дня до исследования:

Ø исключить из рациона питания жирную пищу, продукты, вызывающие повышенное газообразование (молоко, черный хлеб и пр.) или содержащие грубую клетчатку (сырые овощи, фрукты, соки);

Ø Принимать эспумизан по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования, 2 капсулы утром в день исследования (официальные рекомендации ассоциации 24.11.2004 года)

1. УЗИ проводится строго натощак, в первой половине дня: пациент не должен пить воду, принимать пищу

2. После выполнения рентгеновского исследования желудка или кишечника с барием

УЗИ проводится спустя 5-7 дней.

ЭХО (Узи сердца)

Исследование сердца специальной подготовки не требуется. Исследование проводится в любое время